



MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

RETE ILVA

REPORT
OTTOBRE 2016

CENTRO REGIONALE ARIA

ARPA PUGLIA

**Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente**

www.arpa.puglia.it



ARPA PUGLIA
**Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente**

www.arpa.puglia.it

Sommario

Sommario	2
H₂S	5
PM₁₀	8
PM ₁₀ con SWAM 5a	8
PM ₁₀ con analizzatore biorario Environnement	12
PM_{2,5}	13
Benzene	17
Black Carbon	21
IPATOTALI	22
SO₂, NO₂ e CO	25
EFFICIENZA STRUMENTALE	28
CONCLUSIONI	29

Il presente report riassume le elaborazioni dei dati medi giornalieri registrati nel mese di Ottobre 2016 dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria ILVA. La prescrizione n. 85 del Decreto di Riesame dell'AIA rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prevedeva che la Ditta installasse 6 stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria da ubicare in prossimità del perimetro dello stabilimento. Le 6 stazioni sono state installate ed entrate in funzione nel mese di agosto 2013.

Le caratteristiche delle stazioni sono riportate di seguito, mentre in figura 1 è mostrata la loro collocazione. Delle 6 stazioni, 4 si trovano lungo il perimetro dello stabilimento, una nell'area cokeria e una in via Orsini, nel quartiere Tamburi.

Nome stazione	INQUINANTI MONITORATI
COKERIA	H ₂ S, IPA _{TOT} , PM ₁₀ , PM _{2.5} , BTX, Black Carbon, VOC
DIREZIONE	H ₂ S, IPA _{TOT} , PM ₁₀ , PM _{2.5} , BTX, Black Carbon, VOC
RIV	H ₂ S, IPA _{TOT} , PM ₁₀ , PM _{2.5} , BTX, Black Carbon, VOC
PARCHI	H ₂ S, IPA _{TOT} , PM ₁₀ , PM _{2.5} , BTX, Black Carbon, VOC, SO ₂ , NO ₂ , CO
PORTINERIA	H ₂ S, IPA _{TOT} , PM ₁₀ , PM _{2.5} , BTX, Black Carbon, VOC
TAMBURI	H ₂ S, IPA _{TOT} , PM ₁₀ , PM _{2.5} , BTX, Black Carbon, VOC, NO ₂ ,




Fig.1 - Dislocazione delle centraline di monitoraggio

I limiti previsti dal D. Lgs. 155/10 non sono normativamente applicabili alle stazioni della rete ILVA interne agli ambienti di lavoro (*Cokeria, Direzione, Riv, Parchi e Portineria*) che ricadono in aree industriali private, non accessibili alla popolazione; i livelli misurati si confrontano, ugualmente, per fini comparativi con i valori limite di legge, mentre tali limiti si applicano alla stazione denominata *Tamburi*.

H₂S

Nel mese di Ottobre 2016 le concentrazioni più elevate si sono riscontrate nel sito *Cokeria*, con livelli medi giornalieri che in 15 su 30 giorni di dati validi, hanno superato i 7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. L'idrogeno solforato, o H₂S, è un gas incolore dall'odore caratteristico di uova marce, caratterizzato da una soglia olfattiva molto bassa. Per tale sostanza, il valore assunto come soglia olfattiva è pari a 7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, poiché a tale valore la totalità dei soggetti esposti ne distingue l'odore caratteristico.



Nelle altre stazioni non si sono riscontrati valori medi giornalieri superiori a 2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ con l'eccezione della stazione *Meteo Parchi* dove si sono avuti valori medi giornalieri al di sopra di 2,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.






Fig.2 - Livelli di concentrazione di H₂S in $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Come visibile dai grafici seguenti, i valori massimi raggiunti nel mese di Ottobre 2016 nella centralina Cokeria sono confrontabili con quelli di Settembre 2016.





Ottobre 2016



Settembre 2016

H ₂ S (µg/m ³)	Ottobre - 2016
Tamburi	1,4
Portineria	1,1
Cokeria	8,4
RIV1	0,8
Meteo parchi	2,4
Direzione	1,5



PM₁₀

LIMITI VIGENTI	CONCENTRAZIONE LIMITE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
VALORE LIMITE GIORNALIERO	50 µg/m³ , da non superare per più di 35 volte nell'anno	D. Lgs. 155/10
VALORE LIMITE ANNUALE	40 µg/m³	

In ogni stazione di monitoraggio sono installati 2 monitor di PM₁₀, un FAI SWAM 5a che fornisce una concentrazione media giornaliera ed un ENVIRONNEMENT MP101M che fornisce invece dati di concentrazione con frequenza bioraria; quest'ultimo analizzatore consente di valutare gli andamenti del PM₁₀ nel corso della giornata.

PM₁₀ con SWAM 5a

Le concentrazioni giornaliere più elevate sono state registrate nel sito *Cokeria*, le più basse in quello denominato *Portineria*.




Fig.3 - Livelli di concentrazione di PM₁₀ (SWAM) in µg/m³

Come si osserva nel grafico, nel mese di ottobre si sono registrati valori medi giornalieri superiori alla soglia di 50 µg/m³ (al lordo delle sahariane) nei siti:

- *Tamburi*: nessuno su 31 giorni di dati validi;
- *Portineria*: nessuno su 31 giorni di dati validi;
- *Cokeria*: n. 28 su 30 giorni di dati validi;
- *RIVI*: nessuno su 26 giorni di dati validi;

- *Meteo Parchi*: n. 3 su 31 giorni di dati validi (i giorni 4, 5 e 31/10/2016);
- *Direzione*: n. 1 su 30 giorni di dati validi (il giorno 1/10/2016).

Si riportano di seguito i valori medi mensili e le correlazioni tra le concentrazioni giornaliere registrate nei 6 siti di monitoraggio. Le stazioni che mostrano una correlazione accettabile (>0,70) sono evidenziate.

PM₁₀ SWAM (µg/m³)	Ottobre - 2016
Tamburi	27
Portineria	21
Cokeria	76
RIV1	23
Meteo parchi	39
Direzione	40

NOTE: i valori sono al lordo delle sahariane

Correlazioni PM₁₀ swam						
	TAMBURI	PORTINERIA C	COKERIA	RIV 1	METEO PARCHI	Direzione
TAMBURI	1,00	0,07	0,46	0,29	0,76	-0,02
PORTINERIA C		1,00	0,14	0,57	-0,31	0,74
COKERIA			1,00	0,30	0,53	0,41
RIV 1				1,00	0,04	0,41
METEO PARCHI					1,00	-0,20
DIREZIONE						1,00

Si riporta di seguito un riepilogo dei valori medi giornalieri superiori alla soglia di 50 µg/m³ nei vari mesi e dei valori medi mensili di PM₁₀.

PM ₁₀													
Riepilogo n° di giorni con valore medio di PM ₁₀ superiore a 50 µg/m ³													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	n° di giorni
TAMBURI	2	5	1	1	0	2	0	1	0	0			12
PORTINERIA C	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0			7
COKERIA	19	22	20	28	28	29	28	31	30	28			263
RIV 1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0			3
METEO PARCHI	2	7	3	6	3	9	13	10	5	3			61
DIREZIONE	4	9	3	8	4	4	5	5	1	1			44

NOTE: i valori sono al lordo delle sahariane.

PM ₁₀													
Riepilogo valore medio mensile di PM ₁₀													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Media annua parziale
TAMBURI	30	35	33	29	22	30	35	29	25	22			29
PORTINERIA C	20	29	26	25	20	22	25	20	16	17			22
COKERIA	74	86	72	82	84	101	125	121	94	81			92
RIV 1	25	28	26	28	21	20	30	25	23	20			25
METEO PARCHI	36	38	39	37	30	42	52	44	35	30			38
DIREZIONE	34	44	41	44	36	39	39	34	32	32			38

NOTE: i valori sono al lordo delle sahariane.




Fig. 4 – Numero di giorni di superamento del VL di PM₁₀




Fig. 5 - Livelli di concentrazione medi mensili di PM₁₀ (SWAM) in µg/m³

PM₁₀ con analizzatore biorario Environnement

Data la più breve scansione temporale dell'analizzatore PM₁₀ mod. Environnement, con tale strumento è possibile costruire l'andamento del giorno "tipo" delle concentrazioni di PM₁₀ in ogni sito.





Fig.6 - Giorno tipo delle concentrazioni di PM₁₀

PM_{2,5}

LIMITI VIGENTI	CONCENTRAZIONE LIMITE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Valore limite annuale per la protezione della salute umana	25 µg/m ³	D. Lgs. 155/10

Come per il PM₁₀, anche per il PM_{2,5} le concentrazioni più elevate sono state registrate nel sito *Cokeria*, mentre le altre stazioni registrano concentrazioni fra loro paragonabili e solamente dei superamenti del valore di 25 µg/m³ per la stazione *Meteo Parchi*.





Fig. 7 - Livelli di concentrazione di PM_{2,5}

Come visibile dal grafico, nel mese di Ottobre si sono registrati valori medi giornalieri superiori al valore limite annuale di 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nei siti:

- *Tamburi*: nessuno, su 31 giorni di dati validi;
- *Portineria*: nessuno, su 31 giorni di dati validi;
- *Cokeria*: n. 18 su 29 giorni di dati validi;
- *RIV1*: nessuno, su 26 giorni di dati validi;
- *Meteo Parchi*: n. 3 su 31 giorni di dati validi (i giorni 4, 5 e 31/10/2016);
- *Direzione* nessuno, su 30 giorni di dati validi.

Si riportano, di seguito, i valori medi mensili e le correlazioni tra le concentrazioni medie giornaliere registrate nei 6 siti di monitoraggio. Le stazioni che mostrano una correlazione accettabile ($>0,70$) sono evidenziate.

PM2.5 SWAM ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ottobre - 2016
Tamburi	11
Portineria	8
Cokeria	40
RIV1	9
Meteo parchi	13
Direzione	13

	TAMBURI	PORTINERIA C	COKERIA	RIV 1	METEO PARCHI	Direzione
TAMBURI	1,00	0,40	0,46	0,65	0,66	0,44
PORTINERIA C		1,00	0,25	0,63	-0,20	0,76
COKERIA			1,00	0,34	0,75	0,37
RIV 1				1,00	0,15	0,60
METEO PARCHI					1,00	0,01
DIREZIONE						1,00

Si riporta di seguito un riepilogo dei valori medi giornalieri superiori al valore limite annuale di 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e dei valori medi mensili di $\text{PM}_{2.5}$.

PM_{2,5}													
Riepilogo n° di giorni con valore medio giornaliero di PM_{2,5} superiore a 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	n° di giorni
TAMBURI	6	0	2	1	0	1	3	2	2	0			17
PORTINERIA C	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0			3
COKERIA	20	17	18	23	24	25	27	28	30	18			230
RIV 1	3	1	3	1	0	0	0	2	1	0			11
METEO PARCHI	6	3	5	2	2	8	14	12	2	3			57
DIREZIONE	6	4	3	6	1	2	10	5	2	0			39

NOTE: i valori sono al lordo delle sahariane.

PM_{2,5}													
Riepilogo valore medio mensile PM_{2,5}													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Media annua parziale
TAMBURI	17	13	12	14	12	14	19	17	15	11			14
PORTINERIA C	11	11	10	11	9	9	12	11	9	8			10
COKERIA	45	45	37	45	51	60	76	81	59	40			54
RIV 1	14	12	11	14	11	10	17	15	13	9			13
METEO PARCHI	18	14	17	16	14	20	27	27	16	13			18
DIREZIONE	18	17	16	18	16	16	22	18	16	13			17

NOTE: i valori sono al lordo delle sahariane.




Fig. 8 – Numero di giorni di superamento del VL di PM_{2.5}




Fig. 9 - Livelli di concentrazione medi mensili di PM_{2.5} (SWAM) in µg/m³

Benzene

LIMITI VIGENTI	CONCENTRAZIONE LIMITE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
VALORE LIMITE ANNUALE	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	D. Lgs 155/10

Nel mese di Ottobre 2016, le concentrazioni più elevate si sono registrate nel sito *Cokeria*, con livelli medi giornalieri superiori a 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e una media mensile di 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Negli altri siti le concentrazioni medie giornaliere si sono mantenute al di sotto del valore di 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (valore limite medio annuale).





Fig.10 - Livelli di concentrazione di Benzene

Come visibile dal grafico, nel mese di Ottobre si sono registrati valori medi giornalieri superiori al valore di 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nel sito:

- *Cokeria*: n. 21 su 30 giorni di dati validi.

Si riportano di seguito i valori medi mensili registrate nelle 6 stazioni della rete Ilva.

Benzene ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ottobre - 2016
Tamburi	1,2
Portineria	0,6
Cokeria	17,9
RIV1	0,5
Meteo parchi	1,0
Direzione	1,8

Si riporta di seguito un riepilogo dei valori di Benzene medi giornalieri superiori al valore limite annuale di 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e dei valori medi mensili.

BENZENE													
Riepilogo n° di giorni con valore medio giornaliero di Benzene superiore a 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	n° di giorni
TAMBURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
PORTINERIA C	0	0	0	0	0	0	0*	0**	0***	0			0^
COKERIA	23	18	20	16	22	24	30	27	21	21			222
RIV 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
METEO PARCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
DIREZIONE	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0			6

NOTE: ND = Non Disponibile; * dato medio mensile ottenuto da 16 giorni di dati validi; ** dato medio mensile ottenuto da 8 giorni di dati validi; ***dato medio ottenuto da 19 giorni di dati validi; ^ dato ottenuto considerando tutti i dati riportati in tabella.

BENZENE													
Riepilogo valore medio mensile Benzene													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Valore medio annuo parziale
TAMBURI	1,8	1,1	1,1	0,9	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2			1,0
PORTINERIA C	0,9	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3*	0,2**	0,3***	0,6			0,4^
COKERIA	13,0	10,6	12,8	11,8	14,8	16,7	25,6	28,1	17,3	17,9			16,8
RIV 1	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4	0,5			0,6
METEO PARCHI	2,2	0,9	0,8	0,7	0,4	0,8	0,7	0,8	0,8	1,0			0,9
DIREZIONE	3,3	3,0	2,4	1,6	1,1	0,8	0,7	0,6	1,0	1,8			1,6

NOTE: ND = Non Disponibile; * dato medio mensile ottenuto da 16 giorni di dati validi; ** dato medio mensile ottenuto da 8 giorni di dati validi; ***dato medio ottenuto da 19 giorni di dati validi; ^ dato ottenuto considerando tutti i dati riportati in tabella.




Fig. 11 – Numero di giorni di superamento del VL (annuale) di Benzene





Fig. 12 - Livelli di concentrazione medi mensili di Benzene in $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Black Carbon

Il Black Carbon (BC) si forma in seguito a combustione incompleta di combustibili fossili e biomassa; può essere emesso da sorgenti naturali ed antropiche sotto forma di fuliggine. Il parametro relativo al BC totale in aria ambiente non è normato. Lo strumento installato nelle stazioni di monitoraggio della rete ILVA sfrutta il principio dell'assorbimento della radiazione luminosa da parte del BC a determinate lunghezze d'onda. La concentrazione media mensile più alte nel mese di Ottobre 2016 sono state registrate nella stazione *Portineria C*.





Fig.13 - Livelli di concentrazione di Black Carbon

Si riportano di seguito i valori medi mensili registrate nelle 6 stazioni della rete Ilva.


Black carbon (ng/m ³)	Ottobre - 2016
Tamburi-Orsini	1773
Portineria	851
Cokeria	1341
RIV1	1017
Meteo Parchi	1305
Direzione	1391

IPATOTALI


I valori di IPA_{TOT} presenti in aria ambiente sono rilevati con il Monitor ECOCHEM mod. PAS 2000 che utilizza il metodo della fotoionizzazione selettiva degli IPA_{TOT}, adsorbiti sulle superfici degli aerosol carboniosi aventi diametro aerodinamico compreso tra 0,01 e 1,5 µm. Il parametro relativo agli IPA_{TOT} in aria ambiente non è normato, il D.Lgs. 155/10 si riferisce unicamente al Benzo(a)Pirene adsorbito sulla frazione di particolato PM₁₀, indicando un valore obiettivo annuale da non superare. Tali misure, pertanto, sono da considerarsi puramente indicative.




Gennaio 2016




Febbraio 2016




Marzo 2016



Aprile 2016




Maggio 2016




Giugno 2016

N.B.: in data 30/05/2016 è stato rivisto il fattore di calibrazione sito-specifico dell'analizzatore "Cokeria" e mantenuto inalterato quello dell'analizzatore "Cokeria2".




Luglio 2016

N.B.: in data 13/07/ 2016 gli strumenti Cokeria e Meteo Parchi identificati come “2” sono stati inviati al produttore per la taratura





Agosto 2016

N.B.: in data 13/07/ 2016 gli strumenti Cokeria e Meteo parchi identificati come “2” sono stati inviati al produttore per la taratura



Settembre 2016



Ottobre 2016

N.B.: in data 14/10/ 2016 gli strumenti Cokeria e Meteo Parchi identificati come “2” sono rientrati dal produttore dopo essere stati tarati

Fig. 14 - Livelli di concentrazione di IPA_{TOT}

Le concentrazioni medie mensili più alte, nel mese di Ottobre 2016, sono state registrate nelle stazioni *Cokeria*, i valori più bassi nelle stazioni *Portineria C*.

IPATOT (ng/m ³)	Ottobre - 2016
Tamburi	25,7
Portineria C	4,7
Cokeria	28,6
Cokeria 2	39,2*
RIV1	8,3
Meteo parchi	8,8
Meteo Parchi 2	15,6*
Direzione	8,5

Nota: *Strumenti inviati c/o la casa madre per la taratura, il valore medio mensile è riferito a 18 giorni di dati validi.




Fig. 15 - Livelli di concentrazione medi mensili (anno 2016) di IPATOT in ng/m³

NOTE:1) il dato di luglio 2016 di Meteo Parchi2 e Cokeria2 non è riportato in quanto sono disponibili solamente 12 giorni di dati validi; 2) in data 30/05/2016 è stato rivisto il fattore di calibrazione sito-specifico dell'analizzatore "Cokeria" e mantenuto inalterato quello dell'analizzatore "Cokeria2"; 3) in data 13/07/2016 sono stati inviati a tarare c/o il produttore, gli analizzatori Meteo Parchi2 e Cokeria2; 4) in data 14/10/2016 sono rientrati dalla taratura gli analizzatori Meteo Parchi2 e Cokeria2.

SO₂, NO₂ e CO

Questi inquinanti sono monitorati nella stazione *Meteo Parchi*; il parametro NO₂ viene misurato anche nella stazione *Tamburi*. Per nessuno di essi si sono registrate concentrazioni particolarmente elevate.

È opportuno evidenziare che la stazione *Meteo Parchi* si trova ad un'altezza di circa 15 metri dal suolo. Questa collocazione può verosimilmente portare alla registrazione di concentrazioni più basse di quelle registrate al suolo, a causa di fenomeni di diluizione degli inquinanti.

SO₂

Nel grafico di seguito mostrato, è riportato il valore del massimo orario in ogni giorno e il valore medio giornaliero della concentrazione di SO₂ rilevata nel mese di Ottobre nel sito *Meteo Parchi*. Le concentrazioni appaiono al di sotto dei valori limite imposti dalla normativa vigente (D.Lgs 155/2010). Si ricorda che il valore limite orario per la protezione della salute umana è pari a 350 µg/m³ mentre il valore limite calcolato come media delle 24 ore è pari a 125 µg/m³.




Fig.16 - Livelli di concentrazione di SO₂

NO₂

LIMITI VIGENTI NO ₂	CONCENTRAZIONE LIMITE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
VALORE LIMITE ORARIO PER L'ANNO 2016	200 µg/m ³ , da non superare per più di 18 volte nell'anno	D. Lgs. 155/10
VALORE LIMITE ANNUALE PER L'ANNO 2016	40 µg/m ³	
SOGLIA DI ALLARME	400 µg/m ³ da misurarsi su 3 ore consecutive	

Nel grafico di seguito, sono riportati i valori del massimo orario giornaliero registrati nel mese di Ottobre. Come si osserva, non si è verificato nessun superamento del valore limite di 200 µg/m³.




Fig.17 - Livelli di concentrazione di NO₂

CO

Nel seguente grafico sono riportati i valori massimi orari di CO delle medie mobili sulle 8 ore di ogni giorno. Durante il mese di Ottobre non è stato mai superato il valore limite definito in base alla normativa vigente in aria ambiente che è pari a 10 mg/m^3 , dove viene misurato, cioè nel sito *Meteo Parchi*.




Fig.13 - Livelli di concentrazione di CO

EFFICIENZA STRUMENTALE

Si riporta di seguito la percentuale di dati validi prodotti dagli analizzatori nel mese in esame.

	H₂S μg/m ³ 293K	IPA_{TOT} ng/m ³	PM_{10 SWAM} μg/m ³	PM_{10 ENV} μg/m ³	PM_{2.5 SWAM} μg/m ³	Benzene μg/m ³ 293K	Black carbon μg/m ³	SO₃ μg/m ³ 293K	NO₃ μg/m ³ 293K	CO mg/m ³ 293K
TAMBURI	92	100	100	99	100	89	99	/	97	/
PORTINERIA	97	100	100	79	100	97	100	/	/	/
COKERIA	96	99	97	84	94	95	99	/	/	/
RIV1	94	96	84	97	84	92	97	/	/	/
METEO PARCHI	91	100	100	99	100	95	99	97	97	97
DIREZIONE	84	100	97	100	97	96	98	/	/	/

Nota: //

CONCLUSIONI

Nel mese di Ottobre 2016, nel sito *Cokeria* della rete di qualità dell'aria di Ilva, sono state registrate le concentrazioni di inquinanti più elevate (H_2S , PM_{10} , $PM_{2,5}$, Benzene e IPA_{TOT}). L'eccezione è costituita da Black Carbon che nel sito di *Tamburi* (Via Orsini) mostra un valore medio mensile di concentrazione maggiore rispetto a quelli rilevati in tutti gli altri siti.

Si riassumono di seguito le concentrazioni medie mensili dei diversi inquinanti rilevati dalle centraline nel mese di Ottobre 2016.

RIEPILOGO MENSILE						
	H_2S	PM_{10} SWAM al lordo delle sahariane	$PM_{2,5}$ SWAM	BENZENE	BLACK CARBON	IPA_{TOT}
TAMBURI	1,4	22	11	1,2	1773	26
PORTINERIA C	1,1	17	8	0,6	851	5
COKERIA	8,4	81	40	17,9	1341	29
RIV 1	0,8	20	9	0,5	1017	8
METEO PARCHI	2,4	30	13	1,0	1305	9
DIREZIONE	1,5	32	13	1,8	1391	8

NOTE: //.


Il Direttore del Centro Regionale Aria

(Dott. Roberto Giua)



Il Direttore Scientifico

(Dott. Massimo Blonda)



GdL

Dott.sa Alessandra Nocioni

Dott. Gaetano Saracino

p.i. Maria Mantovan