



MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

RETE ACCIAIERIE D'ITALIA

(https://www.arpa.puglia.it/pagina3085_report-di-qualit-dellaria-della-rete-adi-gi-ami-ex-ilva.html)

REPORT

AGOSTO 2022

1 d i 4 4

CENTRO REGIONALE ARIA

Struttura QA di Brindisi-Lecce-Taranto

ARPA PUGLIA

**Agenzia regionale per la prevenzione e
la protezione dell'ambiente**

www.arpa.puglia.it

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it C.F. e P. IVA. 05830420724

**Direzione Scientifica
Centro Regionale Aria**
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it

Sommario

Sommario	2
H₂S	4
PM₁₀	10
PM ₁₀ con SWAM 5a	10
PM ₁₀ con analizzatore biorario Environnement	16
PM_{2.5}	17
Benzene	23
Black Carbon	31
IPATOTALI	32
SO₂, NO₂ e CO	36
SO ₂	36
NO ₂	38
CO	39
EFFICIENZA STRUMENTALE	41
CONCLUSIONI	42

Il presente report riassume le elaborazioni dei dati medi giornalieri registrati nel mese di Agosto 2022 dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria ACCIAIERIE D'ITALIA S.p.A.

Ai sensi della prescrizione n. 85 del Decreto di Riesame dell'AIA rilasciata sono state installate ed entrate in funzione nel mese di Agosto 2013 le 6 stazioni in prossimità del perimetro dello stabilimento.

Le caratteristiche delle stazioni sono riportate di seguito, mentre in figura 1 è mostrata la loro collocazione. Delle 6 stazioni, 4 si trovano lungo il perimetro dello stabilimento, una nell'area cokeria e una in Via Orsini, nel quartiere Tamburi.

Tabella 1: Inquinanti monitorati nelle varie stazioni.

NOME STAZIONE	INQUINANTI MONITORATI
COKERIA	H ₂ S, IPA _{TOT} , PM ₁₀ , PM _{2,5} , BTX, Black Carbon, VOC
DIREZIONE	H ₂ S, IPA _{TOT} , PM ₁₀ , PM _{2,5} , BTX, Black Carbon, VOC
RIV	H ₂ S, IPA _{TOT} , PM ₁₀ , PM _{2,5} , BTX, Black Carbon, VOC
PARCHI	H ₂ S, IPA _{TOT} , PM ₁₀ , PM _{2,5} , BTX, Black Carbon, VOC, SO ₂ , NO ₂ , CO
PORTINERIA	H ₂ S, IPA _{TOT} , PM ₁₀ , PM _{2,5} , BTX, Black Carbon, VOC
TAMBURI - Via Orsini	H ₂ S, IPA _{TOT} , PM ₁₀ , PM _{2,5} , BTX, Black Carbon, VOC, NO ₂ ,

3 di 44



Figura 1: Dislocazione delle centraline di monitoraggio

I limiti previsti dal D. Lgs. n. 155/10 non sono normativamente applicabili alle stazioni della rete ACCIAIERIE D'ITALIA, interne agli ambienti di lavoro (*Cokeria, Direzione, RIVI, Parchi e Portineria*) che ricadono in aree industriali private, non accessibili alla popolazione; i livelli misurati si confrontano, ugualmente, per fini comparativi con i valori limite di legge, mentre tali limiti si applicano alla stazione denominata *Tamburi - Via Orsini*.

H₂S

Per l'idrogeno solforato (H₂S), il valore assunto come soglia olfattiva è pari a 7 µg/m³, poiché a tale valore la totalità dei soggetti esposti ne distingue l'odore caratteristico, con tempo di esposizione di 30 minuti (WHO 2000). E' un gas incolore dall'odore caratteristico di uova marce, tossico a concentrazioni elevate e caratterizzato da una soglia olfattiva molto bassa.

Come anche indicato nel rapporto Istisan n. 16/15 (relativo alle sostanze chimiche CO₂ e H₂S), la legislazione italiana non prevede valori limite per l'H₂S.

In assenza di limiti normativi nazionali ed europei, al fine di individuare un valore di riferimento si impiegheranno le indicazioni della WHO (World Health Organization) e della US Environmental Protection Agency (EPA).

La WHO per l'aria ambiente ha elaborato le linee guida per tale inquinante, anche riferendosi ai tempi di esposizione. Per l'H₂S, le linee guida riportano un valore di 150 µg/m³ come concentrazione media giornaliera e una concentrazione di 7 µg/m³ di breve periodo (30 minuti) al di sotto del quale non si dovrebbero rilevare lamentele tra la popolazione esposta. La frequenza e l'intensità delle maleodoranze può essere valutata sulla base del numero di ore con concentrazione di H₂S superiore alla soglia.

La maggior parte dei Paesi extra-europei e istituzioni internazionali riportano per tale sostanza valori di riferimento per l'aria ambiente riferiti al tempo di mediazione di un'ora. I valori di riferimento variano da un minimo di 7 µg/m³ in Nuova Zelanda ad un massimo di 112 µg/m³ nel Nevada (USA).

Si riporta di seguito la Tabella n. 2 del Rapporto Istisan 16/15.

Rapporti ISTISAN 16/15

La Tabella 2 riporta i valori di riferimento dell'H₂S in aria ambiente adottati da diversi Stati degli USA (43, 44), dal Canada (45), Nuova Zelanda (46) e da altre organizzazioni e Istituti internazionali. Si osserva che in Nuova Zelanda le linee guida sulla qualità dell'aria prevedono per l'H₂S una concentrazione pari a 7 µg/m³ come media su un'ora (46), mentre l'Ontario (Canada) prevede una concentrazione di 7 µg/m³ come media su 24 ore e una concentrazione di 13 come media di 10 minuti (45).

Tabella. 2. Valori di guida/riferimento di H₂S in aria ambiente in alcuni Paesi extra-europei e istituzioni internazionali

Stato o istituzione	Valore guida/riferimento	Rif.
Canada	7 µg/m³ (4,97 ppbv) media su 24 ore;	45
Ontario	13 µg/m³ (9,75 ppbv) media su 10 min	
Nuova Zelanda	7 µg/m³ (4,97 ppmv) media su 1 ora	46
Stati Uniti¹		
Arizona	63 µg/m³ (45 ppbv) media su 1 ora 37,8 µg/m³ (27 ppbv) media giornaliera	43
California	42 µg/m³ (30 ppmv) media su 1 ora	43
Delaware	84 µg/m³ (60 ppmv) media della concentrazione rilevata ogni 3 min consecutivi 42 µg/m³ (30 ppmv) media della concentrazione rilevata ogni 60 min consecutivi	43
Minnesota	70 µg/m³ (05 ppmv) come media su 30 min da non superare più di due volte l'anno 42 µg/m³ (30 ppbv) media su 30 min che non deve essere superata per più di 2 volte in 5 giorni consecutivi	43
Missouri	70 µg/m³ (50 ppbv) media su 30 min	43
Montana	70 µg/m³ (50 ppbv) media su 1 ora che non deve essere superata più di 1 volta l'anno	43
Nevada	112 µg/m³ (80 ppbv) media su 1 ora	43
New York	14 µg/m³ (10 ppbv) come media su 1 ora	43
Wisconsin	116,2 µg/m³ (83 ppbv) media su 24 ore	43
Hawaii	35 µg/m³ (25 ppbv) media su 1 ora	47
ATSDR	MRL ² livelli di rischio minimo: 98 µg/m³ (70 ppbv) per inalazione acuta 28 µg/m³ (20 ppbv) per inalazione intermedia	43
EPA	RfC: 2 µg/m³ (1,42 ppbv) per inalazione cronica	44
NRC	LOA (<i>Level of Distinct Odor Awareness</i>): 14 µg/m³ (9,94 ppbv)	42
IVHHN	35 µg/m³ (25 ppbv) media su 1 ora	48
WHO	150 µg/m³ (106,5 ppbv) media giornaliera	40, 41
	7 µg/m³ (4,97 ppmv) media breve periodo (30 min) per evitare l'insorgenza di odore sgradevoli	
	100 µg/m³ (71 ppbv) concentrazione tollerabile in aria per esposizione di breve periodo	
	20 µg/m³ (14,2 ppbv) concentrazione tollerabile in aria per esposizione di medio periodo	

IVHHN International Volcanic Health Hazard Network; NRC National Research Council of the National Academies
¹ I fattori di conversione utilizzati per l'H₂S in aria, (alla temperatura di 20°C e alla pressione di 101,3 kPa) sono i seguenti: 1 mg/m³ = 0,71 ppm; 1 ppm = 1,4 mg/m³ (41).

² MRL: stima dell'esposizione umana giornaliera a una sostanza pericolosa che è probabile che non mostri apprezzabile rischio sulla salute per effetti avversi non tumorali nel periodo di esposizione e secondo uno specifico percorso.

- Si rileva che nel mese di Agosto 2022 la concentrazione media mensile più elevata si è misurata nel sito *Cokeria*, la più bassa nel sito *Direzione*.
- Non sono state rilevate concentrazioni medie giornaliere superiori al valore soglia indicato dall'OMS (WHO), sulla media giornaliera pari a $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$.




Figura 2 Livelli medi giornalieri di concentrazione di H_2S in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Agosto 2022 (Rete AdI con Cokeria)




Figura 3 Livelli medi giornalieri di concentrazione di H_2S in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Agosto 2022 (Rete AdI senza Cokeria)

Come visibile dal grafico seguente, il valore medio giornaliero massimo misurato nel mese di Agosto 2022 ($20 \mu\text{g}/\text{m}^3$) nella centralina *Cokeria* è risultato confrontabile a quello del mese di Luglio 2022 ($18 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

L'andamento mensile mostra, nel mese di Agosto, rispetto al mese precedente, un aumento delle concentrazioni nelle centraline *Tamburi-Via Orsini* e *Meteo Parchi*, una diminuzione nelle centraline *Cokeria* e *Portineria* confrontabilità nelle altre centraline.




Figura 4 valori medi giornalieri H_2S in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ -Luglio 2022 (Rete ADI con Cokeria)

Tabella 2: Valori medi mensili H_2S .

H_2S ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Agosto – 2022 (Medie mensili)
Tamburi - Via Orsini	4.3
Portineria	1.0
Cokeria	6.9
RIV1	1.6
Meteo parchi	3.9
Direzione	0.8




Figura 5 Andamento dati medi mensili di H₂S (µg/m³) Settembre 2021-Agosto 2022 (Rete ADI con Cokeria)




Figura 6 Andamento dati medi mensili di H₂S (µg/m³) Settembre 2021-Agosto 2022 (Rete ADI senza Cokeria)




Figura 7 Andamento dati medi mensili di H₂S (µg/m³) 2019÷2022
(Rete ADI con Cokeria)




Figura 8 Andamento dati medi mensili di H₂S (µg/m³) 2019÷2022
(Rete ADI senza Cokeria)

PM₁₀

Tabella 3: Limiti normativi.

LIMITI VIGENTI	CONCENTRAZIONE LIMITE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
VALORE LIMITE GIORNALIERO	50 µg/m³ , da non superare per più di 35 volte per anno civile	D. Lgs. 155/10
VALORE LIMITE ANNUALE	40 µg/m³	

In ogni stazione di monitoraggio sono installati 2 monitor di PM₁₀, un FAI SWAM 5a che fornisce la concentrazione media giornaliera ed un ENVIRONNEMENT MP101M che misura invece la concentrazione con frequenza bioraria; quest'ultimo analizzatore consente di valutare gli andamenti del PM₁₀ nel corso della giornata.

1 0 d i 4 4

PM₁₀ con SWAM 5a

La concentrazione media mensile più elevata è stata registrata nel sito *Cokeria*, mentre la più bassa *c/o Portineria C.*

Come visibile dai grafici seguenti, i valori medi mensili nel mese di Agosto 2022 sono risultati in diminuzione rispetto al mese di Luglio 2022 in tutti i siti.

Nel mese osservato si è verificato n. 1 evento di Wind Day, classificato come vero positivo, in data 1 agosto senza superamenti del limite giornaliero del PM₁₀ in nessuna centralina esterna all'area industriale presente a Taranto, compresa Via Orsini.

Nei giorni dal 16 al 20 agosto sono stati previsti fenomeni di avvezione sahariana, che non hanno contribuito a determinare superamenti del valore limite giornaliero di PM₁₀ in nessuna delle stazioni di monitoraggio presenti in provincia di Taranto.




Figura 9 Livelli di concentrazione Agosto 2022 di PM₁₀ (SWAM) in µg/m³




Figura 10 Livelli di concentrazione Luglio 2022 di PM₁₀ (SWAM) in µg/m³

Come si osserva nel grafico, nel mese di Agosto sono stati registrati alcuni valori medi giornalieri superiori alla soglia di 50 µg/m³ nei siti come di seguito riportato:

- *Tamburi - Via Orsini*: nessuno su 17 giorni di dati validi;
- *Portineria*: nessuno su 29 giorni di dati validi;
- *Cokeria*: n. 28 su 31 giorni di dati validi;
- *RIVI*: nessuno su 31 giorni di dati validi;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

- *Meteo Parchi*: n. 2 su 24 giorni di dati validi;
- *Direzione*: n. 4 su 31 giorni di dati validi.

Si riportano di seguito i valori medi mensili e le correlazioni tra le concentrazioni giornaliere registrate nei 6 siti di monitoraggio.

Tabella 4: Valori medi mensili PM₁₀.

PM ₁₀ SWAM	Agosto – 2022 (Medie mensili) (µg/m ³)
Tamburi - Via Orsini	27
Portineria	17
Cokeria	77
RIV1	26
Meteo parchi	40
Direzione	32

1 2 d i 4 4

Tabella 5: Correlazioni PM₁₀ giornalieri.

Correlazioni PM ₁₀ SWAM						
	TAMBURI Via Orsini	PORTINERIA C	COKERIA	RIV 1	METEO PARCHI	DIREZIONE
TAMBURI Via Orsini	1.00	-0.01	0.26	0.56	0.36	0.22
PORTINERIA C		1.00	0.30	0.94	0.09	0.90
COKERIA			1.00	0.27	0.45	0.32
RIV 1				1.00	-0.07	0.89
METEO PARCHI					1.00	-0.10
DIREZIONE						1.00

Nella Tabella 5 sono riportati i coefficienti di correlazione delle medie giornaliere di PM₁₀ rilevate dalle diverse centraline. Le stazioni che mostrano una correlazione accettabile (>0,70) sono evidenziate in rosso; per tali stazioni si può verosimilmente valutare che vi sia una comune sorgente emissiva all'origine dell'inquinante.

Si riportano di seguito le tabelle con i valori medi giornalieri superiori alla soglia di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ed i valori medi mensili di PM_{10} .

Tabella 6: N° di superamenti del limite giornaliero.

PM₁₀													
Riepilogo n° di giorni con valore medio di PM₁₀ superiore a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	N° di giorni
TAMBURI Via Orsini	1	0	1	0	0	0	0	0					2
PORTINERIA C	0	0	1	0	0	3	1	0					5
COKERIA	20	14	20	16	16	30	30	28					174
RIV 1	0	0	2	0	6	10	5	0					23
METEO PARCHI	8	0	11	0	4	12	14	2					51
DIREZIONE	1	3	3	0	0	12	12	4					35

Tabella 7: Valori medi mensili.

PM₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)													
Riepilogo valori medi mensili di PM₁₀													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Media annua parziale
TAMBURI Via Orsini	29	23	27	24	24	31	30	27					27
PORTINERIA C	16	19	24	21	24	29	23	17					22
COKERIA	60	58	73	57	65	99	111	77					75
RIV 1	22	24	30	31	37	44	36	26					31
METEO PARCHI	40	32	43	37	36	50	53	40					41
DIREZIONE	25	29	33	30	36	52	47	32					36




Figura 11 Numero di giorni di superamento del VL di PM₁₀




Figura 12 Livelli di concentrazione medi mensili di PM₁₀ (SWAM) in µg/m³

Nei grafici seguenti, invece, al fine di valutare i trend su di un periodo più lungo, si riportano gli andamenti delle medie mensili del periodo 2019 ÷ 2022, con e senza i dati della centralina *Cokeria*.




Figura 13 Livelli medi mensili di concentrazione di PM₁₀ 2019÷2022 in µg/m³ (Rete ADI con Cokeria)




Figura 14 Livelli medi mensili di concentrazione di PM₁₀ 2019÷2022 in µg/m³ (Rete ADI senza Cokeria)

PM₁₀ con analizzatore biorario Environnement

Data la più breve scansione temporale (bioraria) dell'analizzatore PM₁₀ mod. Environnement è possibile costruire l'andamento del giorno "tipo" delle concentrazioni di PM₁₀ in ogni sito. In questo report il grafico del *giorno tipo* riporta le concentrazioni orarie "tipo" calcolate come media mensile delle singole ore nell'arco della giornata. Ad esempio, il valore riportato alle ore 2 di *Cokeria* è la media mensile di tutte le concentrazioni misurate alle ore 2 di tutti i giorni dall'analizzatore di PM₁₀ presente nella stessa centralina, pertanto sulla base dei valori medi biorari, viene definito un giorno tipo per ciascun sito di monitoraggio.

Per ogni centralina, l'andamento del *giorno tipo* è utile a valutare la variazione nel corso della giornata delle concentrazioni di un dato inquinante per un dato sito, come valutazione media del mese, con relative fasce biorarie relative ai massimi e ai minimi livelli misurati.




Figura 15 Giorno tipo delle concentrazioni di PM₁₀ in µg/m³ (rete ADI con Cokeria)

PM_{2,5}

Tabella 8: Limiti normativi.

LIMITI VIGENTI	CONCENTRAZIONE LIMITE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
VALORE LIMITE ANNUALE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA	25 µg/m ³	D. Lgs. 155/10

Come per il PM₁₀, anche per il PM_{2,5} le concentrazioni più elevate sono state registrate nel sito *Cokeria*.

I valori medi mensili nel mese di Agosto 2022 sono risultati inferiori a quelli del mese di Luglio 2022 in tutti i siti.




Figura 16 Livelli di concentrazione di PM_{2,5} in µg/m³ (rete AdI con Cokeria)




Figura 17 Livelli di concentrazione di PM_{2,5} in µg/m³ (rete AdI senza Cokeria)

Come visibile dai grafici, nel mese di Agosto si sono registrati valori medi giornalieri maggiori del valore limite annuale di 25 µg/m³ nei siti:

- *Tamburi - Via Orsini*: nessuno su 15 giorni di dati validi;
- *Portineria*: nessuno su 25 giorni di dati validi;
- *Cokeria*: n. 29 su 29 giorni di dati validi;
- *RIV1*: nessuno su 31 giorni di dati validi;
- *Meteo Parchi*: n. 13 su 23 giorni di dati validi;
- *Direzione* n. 3 su 30 giorni di dati validi.

Si riportano, di seguito, i valori medi mensili e le correlazioni tra le concentrazioni medie giornaliere registrate nei 6 siti di monitoraggio.

Tabella 9: Valori medi mensili PM_{2,5}.

PM _{2,5} SWAM	Agosto – 2022 (Medie mensili) (µg/m ³)
Tamburi - Via Orsini	14
Portineria	10
Cokeria	58
RIV1	15
Meteo Parchi	26
Direzione	17

Nella tabella seguente, si riportano i coefficienti di correlazione delle medie giornaliere di PM_{2,5} rilevate dalle diverse centraline.

19 di 44

Le stazioni che mostrano una correlazione accettabile (>0,70) sono evidenziate in rosso; per tali stazioni si può verosimilmente valutare che vi sia una comune sorgente emissiva all'origine di questo inquinante.

Tabella 10: Correlazioni PM_{2,5} giornalieri.

Correlazioni PM _{2,5} SWAM						
	TAMBURI Via Orsini	PORTINERIA C	COKERIA	RIV 1	METEO PARCHI	DIREZIONE
TAMBURI Via Orsini	1.00	0.57	0.49	0.76	-0.08	0.69
PORTINERIA C		1.00	0.76	0.45	0.33	0.73
COKERIA			1.00	0.34	0.53	0.61
RIV 1				1.00	0.09	0.78
METEO PARCHI					1.00	0.41
DIREZIONE						1.00

Si riporta di seguito un riepilogo dei valori medi giornalieri risultati maggiori del limite annuale di $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e dei valori medi mensili di $\text{PM}_{2,5}$.

Tabella 11: N° di superamenti del limite giornaliero.

PM_{2,5}													
Riepilogo n° di giorni con valore medio giornaliero di PM_{2,5} superiore a 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	N° di giorni
TAMBURI Via Orsini	1	1	4	2	0	3	6	0					17
PORTINERIA C	0	0	0	0	0	4	1	0					5
COKERIA	21	13	24	13	13	28	28	29					169
RIV 1	0	0	5	2	4	10	3	0					24
METEO PARCHI	2	2	10	4	4	16	14	13					65
DIREZIONE	0	0	4	1	1	18	9	3					36

20 di 44

Tabella 12: Valori medi mensili.

PM_{2,5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)													
Riepilogo valori medi mensili di PM_{2,5}													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Media annua parziale
TAMBURI Via Orsini	18	14	18	15	15	20	24	14					17
PORTINERIA C	8	8	12	8	11	17	13	10					11
COKERIA	35	38	51	33	32	68	81	58					50
RIV 1	13	13	18	16	18	24	18	15					17
METEO PARCHI	16	15	23	18	18	33	29	26					22
DIREZIONE	11	12	18	14	18	37	21	17					18




Figura 18 Numero di giorni di superamento del VL di PM_{2,5}




Figura 19 Livelli di concentrazione medi mensili di PM_{2,5} (SWAM) in µg/m³




Figura 20 Livelli medi mensili di concentrazione di PM_{2,5} 2019÷2022 in µg/m³ (Rete ADI con Cokeria)




Figura 21 Livelli medi mensili di concentrazione di PM_{2,5} 2019÷2022 in µg/m³ (Rete ADI senza Cokeria)

Benzene

Tabella 13: Limiti normativi.

LIMITI VIGENTI	CONCENTRAZIONE LIMITE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
VALORE LIMITE ANNUALE	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	D. Lgs. 155/10

Nel mese di Agosto 2022, le concentrazioni più elevate sono state registrate nel sito *Cokeria*, con livelli medi giornalieri superiori a 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (valore limite media annua) per 27 giorni su 27 di dati validi e con una media mensile di 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Nei siti *Portineria C* e *RIVI*, le concentrazioni medie giornaliere si sono attestate al di sotto del valore di 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (valore limite medio annuale), mentre c/o *Tamburi Via Orsini*, *Meteo Parchi* e *Direzione* si sono avuti diversi dati maggiori del valore di 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Le medie mensili di benzene registrate nel mese di Agosto sono risultate in calo o senza variazioni significative rispetto ai mesi precedenti in tutti i siti, ad eccezione di *Tamburi Via Orsini* (5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) e *Meteo Parchi* (7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) dove sono maggiori rispetto al mese precedente.

23 di 44




Figura 22 Livelli di concentrazione di Benzene in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (rete AdI con Cokeria)




Figura 23 Livelli di concentrazione di Benzene in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (rete AdI senza Cokeria)

Come visibile dai grafici di Figura 24a e Figura 24b le concentrazioni di Benzene a *Tamburi Via Orsini* (che ha registrato numerosi dati mancanti per la centralina) e *Meteo Parchi* hanno andamenti coerenti a differenza dei valori di *Tamburi Via Orsini* e *Direzione*.




Figura 24a Confronto livelli di concentrazione di Benzene in $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Tamburi - Via Orsini vs Meteo Parchi




Figura 25b Confronto livelli di concentrazione di Benzene in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Tamburi - Via Orsini vs Direzione

Come visibile dai grafici, nel mese di Agosto si sono registrati valori medi giornalieri superiori alla soglia annuale di $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in tutti i siti ad eccezione di *RIV1 e Portineria C*:

Si riportano di seguito i valori medi mensili registrati nelle 6 stazioni della rete ACCIAIERIE D'ITALIA.

Tabella 14: Valori medi mensili Benzene.

Benzene	Agosto – 2022 (Medie mensili) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Tamburi - Via Orsini	5.0
Portineria	0.3
Cokeria	29.9
RIV1	1.0
Meteo parchi	7.0
Direzione	1.3



Si fa presente che nel mese osservato si è verificato un evento di Wind Day Vero Positivo (VP) in data 01 Agosto.

Durante il giorno di Wind Day del 01 Agosto, nel sito esterno della rete ADI posto in *Tamburi - Via Orsini*, non è disponibile il dato medio giornaliero di Benzene.

Nel sito interno *Meteo Parchi* il valore medio giornaliero di Benzene è risultato pari a $8.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ il 01/08/2022. In altri siti posti nell'area di Taranto le medie giornaliere sono risultate inferiori a $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$; in particolare l'01/08/2022 nel sito della RRQA in *Via Machiavelli* si è riscontrato un valore di $0.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Si riporta, di seguito, un riepilogo del numero dei valori di Benzene medi giornalieri maggiori della soglia annuale di $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e dei valori medi mensili.

Tabella 15: N° di superamenti del limite giornaliero.

BENZENE													
Riepilogo n° di giorni con valore medio giornaliero di Benzene superiore a $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	N° di giorni
TAMBURI Via Orsini	5	1	5	3	0	5	4	7					30
PORTINERIA C	0	0	0	0	0	0	0	0					0
COKERIA	27	23	26	24	23	28	30	27					208
RIV 1	0	0	0	0	0	0	0	0					0
METEO PARCHI	15	8	8	5	4	9	6	14					69
DIREZIONE	7	8	12	11	17	5	4	2					66

27 di 44

Tabella 16: Valori medi mensili.

BENZENE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)													
Riepilogo valori medi mensili Benzene													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Medio annua parziale
TAMBURI Via Orsini	3.6	2.8	2.7	2.3	1.2	4.0	3.0	5.0					3.1
PORTINERIA C	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.4	0.6	0.3					0.6
COKERIA	23.8	28.5	30.1	40.8	31.0	38.0	40.2	29.9					32.8
RIV 1	0.9	1.1	1.1	1.3	1.6	1.8	1.4	1.0					1.3
METEO PARCHI	5.9	4.0	4.2	3.0	3.6	6.0	3.7	7.0					4.7
DIREZIONE	3.5	5.3	6.2	5.3	7.4	3.3	2.0	1.3					4.3




Figura 26 Livelli di concentrazione medi mensili di Benzene in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Rete AdI con Cokeria)




Figura 27 Livelli di concentrazione medi mensili di Benzene in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Rete AdI senza Cokeria)

Nei grafici seguenti, invece, al fine di valutare i trend su di un periodo più lungo, si riportano gli andamenti delle medie mensili del periodo 2019 ÷ 2022, con e senza i dati della centralina *Cokeria*.




Figura 28 Livelli medi mensili di concentrazione di Benzene 2019÷2022 in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Rete ADI con Cokeria)




Figura 29 Livelli medi mensili di concentrazione di Benzene 2019÷2022 in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Rete ADI senza Cokeria)

A seguire, i trend delle medie mobili mensili di benzene nella rete AdI dal 2019 ÷ 2022.





Figura 30 Medie mobili mensili di concentrazione di Benzene in $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Black Carbon

Il Black Carbon (BC) si forma in seguito a combustione incompleta di combustibili fossili e biomassa; può essere emesso da sorgenti naturali ed antropiche sotto forma di fuliggine. Il parametro relativo al BC totale in aria ambiente non è normato. Lo strumento installato nelle stazioni di monitoraggio della rete Acciaierie d'Italia S.p.A. sfrutta il principio dell'assorbimento della radiazione luminosa da parte del BC a determinate lunghezze d'onda. La concentrazione media mensile più alta nel mese di Agosto 2022 è stata registrata nella stazione *Tamburi - Via Orsini*.




Figura 31 Livelli di concentrazione di Black Carbon in ng/m³







Si riportano, di seguito, i valori medi mensili registrati nelle 6 stazioni della rete ACCIAIERIE D'ITALIA S.p.A.


Tabella 17: Valori medi mensili Black Carbon.

Black carbon (ng/m ³)	Agosto – 2022 (Medie mensili)
Tamburi - Via Orsini	1070
Portineria	585
Cokeria	761
RIV1	482
Meteo Parchi	518
Direzione	676


IPATOTALI

I valori di $IPATOT$ presenti in aria ambiente sono rilevati con il Monitor ECOCHEM mod. PAS 2000 che utilizza il metodo della fotoionizzazione selettiva degli $IPATOT$, adsorbiti sulle superfici degli aerosol carboniosi aventi diametro aerodinamico compreso tra 0,01 e 1,5 μm . Il parametro relativo agli $IPATOT$ in aria ambiente non è normato, il D.lgs. n.155/10 si riferisce unicamente al Benzo(a)Pirene adsorbito sulla frazione di particolato PM_{10} , indicando un valore obiettivo annuale da non superare. Tali misure, pertanto, sono da considerarsi puramente indicative.







Febbraio 2022




Maggio 2022




Marzo 2022




Giugno 2022




Aprile 2022



Luglio 2022



Rete AdI con Cokeria



Rete AdI senza Cokeria

Figura 32 Livelli di concentrazione di IPA_{TOT} in ng/m³

Le concentrazioni medie mensili più alte di IPA totali, nel mese di Agosto 2022, sono state registrate nella stazione Cokeria, i valori più bassi nella stazione Direzione.

Tabella 18: Valori medi mensili IPA_{TOT}.

IPA _{TOT} (ng/m ³)	Agosto – 2022 (Medie mensili)
Tamburi - Via Orsini	8
Portineria C	3
Cokeria	18
Cokeria 2	15
RIV1	5
Meteo Parchi	5
Meteo Parchi 2	5
Direzione	2




Figura 33 Andamento livelli di concentrazione di IPA_{TOT} in ng/m³

Nei grafici seguenti, invece, al fine di valutare i trend su di un periodo più lungo, si riportano gli andamenti delle medie mensili del periodo 2019 ÷ 2022, con e senza i dati della centralina Cokeria.




Figura 34 Livelli medi mensili di concentrazione di IPA_{TOT} 2019 ÷ 2022 in ng/m³ (Rete ADI con Cokeria)




Figura 35 Livelli medi mensili di concentrazione di IPA_{TOT} 2019 ÷ 2022 in ng/m³ (Rete ADI senza Cokeria)




Figura 36 Livelli medi mensili di concentrazione di IPA_{TOT} 2019 ÷ 2022 Cokeria in ng/m³

SO₂, NO₂ e CO

Questi inquinanti sono monitorati nella stazione *Meteo Parchi*; il parametro NO₂ viene misurato anche nella stazione *Tamburi - Via Orsini*.

È opportuno evidenziare che la stazione *Meteo Parchi* si trova ad un'altezza di circa 15 metri dal suolo. Questa collocazione può verosimilmente portare alla registrazione di concentrazioni più basse di quelle registrate al suolo, a causa di fenomeni di diluizione degli inquinanti.

SO₂

Tabella 19: Limiti normativi.

LIMITI VIGENTI	CONCENTRAZIONE LIMITE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
VALORE LIMITE ORARIO	350 µg/m³ , da non superare più di 24 volte per anno civile	D. Lgs. 155/10
VALORE LIMITE GIORNALIERO	125 µg/m³ , da non superare più di 3 volte per anno civile	

3 6 d i 4 4

Nel grafico di seguito mostrato, è riportato il valore del massimo orario e il valore medio giornaliero della concentrazione di SO₂ rilevati giornalmente nel mese di Agosto nel sito *Meteo Parchi*. Le concentrazioni riscontrate appaiono al di sotto dei valori limite imposti dalla normativa in aria ambiente.

Si ricorda che il valore limite orario per la protezione della salute umana è pari a 350 µg/m³ mentre il valore limite calcolato come media delle 24 ore è pari a 125 µg/m³, ma è applicabile solo nei siti di monitoraggio della qualità dell'aria esterni alle aree industriali. Il confronto coi limiti è, pertanto, indicativo.

Come noto, per il parametro SO₂, il D.Lgs. n.155/2010 prevede che il valore limite orario in aria ambiente e in siti esterni alle aree industriali, pari a 350 µg/m³, non deve essere superato per più di 24 volte nell'anno; il valore limite giornaliero è pari a 125 µg/m³.




Figura 37 Livelli di concentrazione di SO₂ in µg/m³




Figura 38 Livelli medi mensili di concentrazione di SO₂ - 2019÷2022 in µg/m³

NO₂

Tabella 20: Limiti normativi.

LIMITI VIGENTI NO ₂	CONCENTRAZIONE LIMITE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
VALORE LIMITE ORARIO	200 µg/m³ , da non superare per più di 18 volte nell'anno	D. Lgs. 155/10
VALORE LIMITE ANNUALE	40 µg/m³	
SOGLIA DI ALLARME	400 µg/m³ da misurarsi su 3 ore consecutive	

Nel grafico di seguito, sono riportati i valori del massimo orario giornaliero registrati nel mese di Agosto. Le concentrazioni riscontrate, durante l'arco del mese, appaiono al di sotto dei valori limite imposti dalla normativa vigente in aria ambiente.



Figura 39 Livelli di concentrazione di NO₂ in µg/m³




Figura 40 Livelli medi mensili di concentrazione di NO₂ 2019 ÷ 2022 in µg/m³

CO

Tabella 21: Limiti normativi.

LIMITI VIGENTI CO	CONCENTRAZIONE LIMITE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
VALORE LIMITE MEDIA MASSIMA GIORNALIERA CALCOLATA SU 8 ORE	10 mg/m³	D. Lgs. 155/10

Nel seguente grafico sono riportati i valori massimi orari di CO delle medie mobili sulle 8 ore di ogni giorno. Durante il mese di Agosto non è stato mai superato il valore limite definito in base alla normativa vigente in aria ambiente che è pari a 10 mg/m³, dove viene misurato, cioè nel sito *Meteo Parchi*.




Figura 41 Livelli di concentrazione di CO in mg/m³




Figura 42 Livelli medi mensili di concentrazione di CO 2019÷2022 in mg/m³

EFFICIENZA STRUMENTALE

Si riporta di seguito la percentuale di dati validi prodotti dagli analizzatori della rete di ACCIAIERIE D'ITALIA SPA nel mese in esame. In rosso sono evidenziati i casi in cui è risultata inferiore al 75%.

Tabella 22: Percentuale dati validi nel mese.

	H ₂ S	IPA	PM ₁₀ SWAM	PM ₁₀ ENV	PM _{2,5} SWAM	Benzene	Black carbon	SO ₂	NO ₂	CO
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
TAMBURI Via Orsini	67	71	55	74	48	62	73	/	71	/
PORTINERIA	69	100	94	100	81	89	100	/	/	/
COKERIA	96	100	100	100	94	86	99	/	/	/
RIV1	98	100	100	100	100	59	99	/	/	/
METEO PARCHI	90	100	77	100	74	62	100	93	98	98
DIREZIONE	98	100	100	98	97	98	100	/	/	/

4 1 d i 4 4

CONCLUSIONI

Nel mese di Agosto 2022, le concentrazioni medie mensili più elevate sono state registrate nel sito di monitoraggio denominato *Cokeria* per tutti gli inquinanti Benzene, PM₁₀ e PM_{2,5} ad eccezione del Black Carbon per il quale il valore più elevato è stato riscontrato nel sito di monitoraggio *Tamburi - Via Orsini*.

Si riassumono, di seguito, le concentrazioni medie mensili dei diversi inquinanti rilevati dalle centraline della rete QA di Acciaierie di Italia S.p.A. nel mese di Agosto 2022.

Tabella 23: Valori medi mensili.

RIEPILOGO MENSILE						
	H ₂ S (µg/m ³)	PM ₁₀ SWAM (µg/m ³)	PM _{2,5} SWAM (µg/m ³)	BENZENE (µg/m ³)	BLACK CARBON (ng/m ³)	IPA TOT (ng/m ³)
TAMBURI Via Orsini	4.3	27	14	5.0	1070	8
PORTINERIA C	1.0	17	10	0.3	585	3
COKERIA	6.9	77	58	29.9	761	18
RIV 1	1.6	26	15	1.0	482	5
METEO PARCHI	3.9	40	26	7.0	518	5
DIREZIONE	0.8	32	17	1.3	676	2

4 2 d i 4 4

H₂S: Si rileva che nel mese di Agosto 2022 la concentrazione media mensile più elevata si è misurata nel sito *Cokeria*, la più bassa nel sito *Direzione*.

Non sono state rilevate concentrazioni medie giornaliere superiori al valore soglia indicato dall'OMS sulla media giornaliera, pari a 150 µg/m³.

PM₁₀: La media mensile di PM₁₀ nel sito di *Tamburi - Via Orsini* è risultata pari a 27 µg/m³, inferiore al valore limite sulla media a annua che il D. Lgs n. 155/2010 fissa in 40 µg/m³. I valori medi mensili nel mese di Agosto 2022 sono risultati in diminuzione rispetto a quelli del mese di Luglio 2022 in tutti i siti.

Nel mese osservato si è verificato n. 1 evento di Wind Day, classificato come vero positivo, in data 1 agosto, senza superamenti del limite giornaliero del PM₁₀ in nessuna centralina esterna all'area industriale presente a Taranto, compresa *Via Orsini* (della rete ADI).

Nei giorni dal 16 al 20 agosto sono stati previsti fenomeni di avvezione sahariana, che non hanno contribuito a determinare superamenti del valore limite giornaliero di PM₁₀ in nessuna delle stazioni di monitoraggio presenti in provincia di Taranto.

4 3 d i 4 4

PM_{2,5}: Come per il PM₁₀, anche per il PM_{2,5} le concentrazioni più elevate sono state registrate nel sito *Cokeria*.

I valori medi mensili nel mese di Agosto 2022 sono risultati inferiori a quelli del mese di Luglio 2022 in tutti i siti.

Benzene: Nel mese di Agosto 2022, le concentrazioni più elevate sono state registrate nel sito *Cokeria*, con livelli medi giornalieri superiori a 5 µg/m³ (valore limite media annua) per 27 giorni su 27 di dati validi e con una media mensile di 30 µg/m³. Nei siti *Portineria C* e *RIVI*, le concentrazioni medie giornaliere si sono attestate al di sotto del valore di 5 µg/m³ (valore limite medio annuale), mentre *c/o Tamburi Via Orsini*, *Meteo Parchi* e *Direzione* si sono avuti diversi dati maggiori rispetto al valore di 5 µg/m³.

Le medie mensili di benzene registrate nel mese di Agosto sono risultate in calo o senza variazioni significative rispetto ai mesi precedenti in tutti i siti, ad eccezione di *Tamburi Via Orsini* ($5 \mu\text{g}/\text{m}^3$) e *Meteo Parchi* ($7 \mu\text{g}/\text{m}^3$) dove sono risultate in aumento rispetto a luglio.

NO₂: Per quanto riguarda questo inquinante gassoso misurato presso la stazione *Meteo Parchi* e *Tamburi-Via Orsini*, vi è stata conformità coi limiti previsti dal D.Lgs. n. 155/10, normativa di riferimento applicabile solamente alla centralina *Tamburi-Via Orsini*.

CO: Non è stato mai superato il valore limite definito in base alla normativa vigente in aria ambiente (non applicabile all'interno dei siti industriali) che è pari a $10 \text{ mg}/\text{m}^3$.

SO₂: Le concentrazioni riscontrate appaiono al di sotto dei valori limite imposti dalla normativa in aria ambiente, D.lgs. n. 155/2010, non applicabile all'interno dei siti industriali.

4 4 d i 4 4


Si fa presente, infine, che il rispetto dei limiti di qualità dell'aria previsti dalla normativa italiana (il citato D.Lgs. n. 155/2010), recepimento di analoga normativa europea, sia per quanto riguarda il limite giornaliero del PM₁₀ che quello annuale, è riferito esclusivamente alla valutazione di aspetti di carattere ambientale e che la presente relazione non contiene elementi di valutazioni di carattere sanitario, che restano di esclusiva competenza delle Aziende Sanitarie Locali.

Taranto, 26 Settembre 2022

Il Direttore del CRA
Dott. Domenico Gramegna

Struttura. Qualità dell'aria BR-LE-TA

Dott.sa Alessandra Nocioni



Elaborazione dati a cura di:

Dott. Gaetano Saracino

Validazione dati a cura dell'Ufficio QA di Taranto:

p.i. Maria Mantovan, Dott. Gaetano Saracino, Dott. Daniele Cornacchia, Dott. Valerio Margiotta

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Direzione Scientifica

Centro Regionale Aria

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it C.F. e P. IVA. 05830420724

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: aria@arpa.puglia.it